jello
2-4
10+
25 min
DEVIR
La Forêt de Savernake
Les animaux
Rodrigo Rego
Núria Aparicio

Le Hamster

Le hamster fait partie de la famille des cricétidés, qui comprend dix-neuf espèces différentes, dont la plupart sont originaires d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Asie. Dans les pays développés, ces petits rongeurs sont devenus des animaux de compagnie très populaires et des sujets de laboratoire, mais dans de nombreuses régions du monde où ils vivent à l'état sauvage, ils sont considérés comme des parasites attaquant les cultures. Un comportement caractéristique des hamsters est d'accumuler de la nourriture dans leurs joues, pour l'emmener dans leurs réserves souterraines. Lorsque leurs joues sont pleines, la tête des hamsters peut doubler, voire tripler de taille.

Le Hérisson européen

Le Hérisson européen (*Erinaceus europaeus*) vit dans tous les types de forêts, à feuilles persistantes ou caduques, à leur périphérie et dans les lieux façonnés par l'homme, tels que les terres agricoles, les jardins et les parcs et, de manière générale, dans les endroits peu froids et peu humides.

Il rôde souvent près des villes et, en hiver, il aime profiter des constructions humaines pour se protéger du froid. Il est omnivore, chasse et mange des insectes, des larves, des mille-pattes, des escargots, des limaces, des vers de terre, et même parfois des grenouilles, des souris, des lézards, des couleuvres ou des vipères. Ce régime est complété par des œufs et des oisillons de volatiles nichant au sol, des glands, des baies ainsi que d'autres fruits.

Le Blaireau européen

Le Blaireau européen (*Meles meles*) est un animal sociable qui vit généralement en groupes de deux à douze individus. Les clans de blaireaux sont territoriaux, surtout les mâles, qui défendent agressivement leur territoire contre la présence de blaireaux externes au groupe.

C'est un animal omnivore qui se nourrit d'insectes, en particulier d'abeilles et de miel (d'où son nom scientifique, *meles*, qui signifie « miel » en latin), mais aussi d'invertébrés, de petits mammifères et reptiles, de maïs, de fruits et de plantes, et parfois aussi de charognes. Dans les îles britanniques et en Europe du Nord, les vers de terre constituent la base de son alimentation, tandis qu'en Europe du Sud, il complète ses repas avec des insectes, des fruits et des céréales. En automne, il accumule d'importantes réserves de graisse qui lui permettront de jeûner tout au long de l'hiver.

Le Castor d'Europe

Le Castor d'Europe ou d'Eurasie (*Castor fiber*) est un grand rongeur semi-aquatique. Cet animal timide est parfaitement adapté à la vie amphibie et nocturne et passe le plus clair de son temps caché dans ses terriers ou dans les sous-bois. Avec ses dents robustes, il abat les arbres pour en manger l'écorce et les feuilles, en plus d'en tirer les matériaux nécessaires à la construction de barrages. Il se nourrit également d'autres végétaux du bord de la rivière, comme les rhizomes de nénuphars.

Le castor fabrique des huttes en forme de dômes par amoncellement de bâtons et de boue. Celles-ci sont généralement situées à des endroits stratégiques au milieu des étangs et ne sont accessibles que par des entrées submergées. Des familles nombreuses vivent dans ces huttes.

Dans l'eau, les castors utilisent leurs grandes pattes arrière palmées pour se propulser à une vitesse pouvant atteindre 8 km/h, et leur queue en forme de rame leur sert de gouvernail. Ils peuvent rester sous l'eau pendant une quinzaine de minutes sans remonter à la surface. Leurs paupières transparentes leur servent de lunettes de plongée.

Le Renard commun

La couleur prédominante de la fourrure du Renard roux ou Renard commun (*Vulpes vulpes*) est un rouge brunâtre, mais il existe également des individus aux couleurs grisâtres, connus sous le nom de Renards argentés. La présence du renard s'est élargie parallèlement à l'expansion des populations humaines et, actuellement, il s'agit de l'espèce la plus répandue parmi les carnivores : il est présent dans tout l'hémisphère nord, du cercle arctique à l'Afrique du Nord, en passant par l'Amérique du Nord, l'Eurasie et le Japon. Il a également été introduit en Australie.

Il vit dans presque tous les types d'habitats, mais sa population est toujours plus importante à proximité des zones habitées, car les activités humaines lui garantissent une source de nourriture presque illimitée. En général, c'est un chasseur solitaire, territorial, crépusculaire ou nocturne. Une grande part de son alimentation est constituée d'invertébrés (insectes, mollusques, vers de terre et écrevisses) et de vertébrés (souris, taupes, lapins, oiseaux, œufs, amphibiens, petits reptiles et poissons), ainsi que de quelques végétaux (mûres, pommes, prunes et autres fruits). Il peut parfois s'attaquer aux faons et aux chevreuils. S'il a plus de nourriture qu'il ne peut en manger en une seule fois, il l'enterre pour pouvoir la consommer plus tard.

Le Geai bleu

Le Geai bleu (*Cyanocitta cristata*) est un corvidé nord-américain. Il possède une crête prononcée et son plumage bleu se trouve principalement sur la moitié supérieure de son corps, de la tête à la queue. Le dessous de son corps est blanc et il possède un collier noir autour du cou et sur les côtés de la tête. Sa face est blanche. Comme chez d'autres oiseaux bleutés, la coloration bleue n'est pas due à des pigments, mais à une réfraction particulière de la lumière due à la structure interne de ses plumes.

Il vit principalement dans les forêts mixtes de hêtres et de chênes. Il est également visible dans les parcs et les jardins de certaines villes. Il se nourrit aussi bien au sol que dans les arbres et consomme toutes sortes de végétaux et d'animaux : glands, faînes, graines herbacées, céréales, fruits, baies, arachides, pain, viande, œufs, oisillons d'autres espèces d'oiseaux, de nombreux invertébrés des parcs et des jardins et de la nourriture pour oiseaux. Son comportement est agressif et il a la mauvaise réputation de détruire les nids et les œufs d'autres oiseaux. Les Geais bleus forment généralement des couples monogames pour la vie.

La Pie

La Pie bavarde (*Pica pica*) vit dans toute l'Europe (à l'exception de l'Islande, de la Corse, de la Sardaigne et des Baléares) ainsi qu'en Asie (des zones tempérées à la Sibérie orientale). Elle est présente dans tous les habitats, à l'exception des forêts denses et des lieux situés à plus de 1 500 m d'altitude. Elle préfère la proximité des champs accidentés et des lieux dégradés par l'homme (villes, décharges et routes). C'est une espèce qui a su s'adapter, se multiplier et tirer profit des modifications de l'environnement engendrées par l'activité humaine.

C'est un oiseau très sociable et grégaire en hiver. Au printemps et en été, les pies se déplacent en couple, tandis qu'en automne et en hiver, elles se rassemblent en bandes plus importantes. C'est un animal omnivore qui se nourrit d'insectes, d'escargots, de limaces, de lézards, d'œufs et d'oisillons, de charognes, de cerises, de noix, de raisins et de toutes sortes de fruits en général, de pommes de terre et de carottes.

La Taupe

La Taupe d'Europe (*Talpa europaea*) est un petit mammifère très bien adapté au creusement de galeries et à la vie souterraine. Son corps est cylindrique et fusiforme, et ses pattes courtes et robustes, en forme de pelle, sont munies de grandes et puissantes griffes qu'elle utilise pour creuser la terre. Ses coudes sont décalés et orientés vers son dos de sorte que les paumes de ses membres antérieurs soient tournées vers l'arrière, ce qui améliore son habileté à creuser. Les taupes se fient principalement à leur sens du toucher et ont des vibrisses sur le visage, les membres et la queue. Leur museau effilé et flexible est particulièrement sensible.

Bien qu'elles mangent des mouches et des larves de coléoptères, les vers de terre constituent l'essentiel de leur régime alimentaire. Il a été observé que les Taupes européennes mangent chaque jour une quantité de nourriture correspondant à peu près à la moitié de leur poids.



Le Grand Corbeau

Le Grand Corbeau (*Corvus corax*) est un oiseau présent dans tout l'hémisphère nord. En général, l'espérance de vie des corbeaux est d'une quarantaine d'années. Une fois qu'ils se sont accouplés, les corbeaux restent ensemble toute leur vie, défendant leur territoire. Les Grands Corbeaux coexistent avec les humains depuis des milliers d'années Le succès de cette espèce est en grande partie dû à son régime omnivore, car c'est un oiseau extrêmement opportuniste qui se nourrit de charognes, d'insectes, de déchets alimentaires, de céréales, de fruits, de baies et de petits animaux tels que des amphibiens, des reptiles et d'autres oiseaux.

Cette espèce possède l'un des plus gros cerveaux de tous les oiseaux et est connue pour ses capacités de résolution de problèmes, d'imitation et d'intuition, qui démontrent sa grande intelligence. Des études ont d'ailleurs démontré que les Grands Corbeaux peuvent demander à d'autres animaux, tels que les loups et les coyotes, de « travailler » pour eux, en ouvrant et en déchirant les charognes, afin de les rendre plus accessibles. Les jeunes corbeaux sont parmi les oiseaux les plus joueurs : on les a vus glisser dans la neige, apparemment pour le simple plaisir, et même jouer avec d'autres espèces, comme les loups et les chiens. Ils sont capables de reconnaître différentes voix humaines, ainsi que les cris d'autres espèces d'oiseaux. Au fil des siècles, le Grand Corbeau a occupé une place de choix dans les mythes, le folklore et les représentations artistiques de cultures anciennes, allant jusqu'à être vénéré comme un dieu ou un symbole spirituel.

La Chouette effraie

La Chouette effraie ou Effraie des clochers (*Tyto alba*) est présente sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. C'est un oiseau sédentaire qui construit généralement son nid dans les clochers des églises et les bâtiments abandonnés, bien qu'elle profite également des arbres creux.

Elle se nourrit principalement de souris (un spécimen adulte en mange trois par jour) et, lorsqu'elle en attrape beaucoup, elle les stocke dans son nid. En période de pénurie de souris, elle se nourrit de petits oiseaux et, parfois, de papillons de nuit et de chauves-souris. Dans le nid, si une jeune chouette meurt, elle sert de nourriture à ses frères et sœurs.

C'est une chasseuse nocturne, mais lorsque la nourriture manque, la chouette peut aussi chasser en journée. Sa méthode consiste à utiliser son large disque facial comme parabole pour capter les sons émis par ses proies. Une fois localisées, elle s'abat sur elles dans un silence presque absolu et les attrape avec ses longs doigts griffus.

La Souris

Il existe 39 espèces de rongeurs de la famille des souris et, parmi elles, la Souris domestique ou Souris commune (*Mus musculus*) est la plus fréquente. On estime qu'elle est la deuxième espèce de mammifère la plus répandue sur Terre, après l'Homo sapiens. Elle vit toujours à proximité de l'homme, avec lequel elle a noué une relation étroite. C'est aussi le mammifère le plus utilisé dans les expériences de laboratoire et il existe de nombreuses variétés transgéniques destinées à l'étude des maladies génétiques humaines.

Les souris possèdent de longues moustaches (vibrisses) qui sont sensibles au toucher et leur fournissent des informations sur leur environnement. Leur sens de la vue est peu développé, contrairement à leur odorat, qu'elles utilisent pour trouver de la nourriture et d'autres souris. Leur ouïe est également très développée, bien plus que celle de l'homme. Même si elles se déplacent généralement à quatre pattes, elles peuvent parfois se dresser sur leurs pattes arrière, en s'aidant de leur queue, pour manger, s'orienter ou se battre. Elles sont de bonnes sauteuses, grimpeuses et nageuses.

Ce sont des animaux territoriaux qui sont actifs principalement au crépuscule ou la nuit, ce qui leur permet d'éviter les lumières vives. Ils s'organisent généralement en groupes dirigés par un seul mâle dominant, avec plusieurs femelles et des individus plus jeunes. Lorsqu'un mâle atteint la maturité sexuelle, il peut engager un combat à mort avec le mâle dominant de son groupe. Les souris ont peur des rats, qui peuvent les tuer et les manger. C'est pourquoi les rats et les souris ne vivent généralement pas ensemble.

Leur régime alimentaire se compose principalement de légumes, mais elles peuvent également manger de la viande et des produits laitiers. Elles boivent de l'eau, mais elles en ont besoin de très peu, car elles savent profiter de celle contenue dans leur nourriture. Elles peuvent d'ailleurs manger leurs propres excréments afin de bénéficier des nutriments qu'ils contiennent.

La Musaraigne

Les musaraignes sont de très petits mammifères (quelques centimètres de long, queue comprise), avec de petits yeux et un long museau aux moustaches très sensibles. Elles ressemblent à des souris, mais n'étant pas des rongeurs, elles sont en réalité bien plus proches des taupes.

Ce sont les mammifères les plus actifs qui soient. Elles se nourrissent de jour comme de nuit, toutes les deux ou trois heures (elles peuvent d'ailleurs mourir si elles restent plus de quatre heures sans manger). De nombreuses espèces, en particulier celles de l'Ancien Monde, mangent chaque jour une quantité d'insectes équivalente à leur poids corporel. Leur régime alimentaire est à base d'invertébrés et elles peuvent parfois manger des charognes, voire chasser et manger de petits vertébrés tels que des mulots, des lézards, des escargots et, dans de rares cas, des rats.

Différentes espèces de musaraignes sont présentes presque partout dans le monde. La Musaraigne étrusque ou Pachyure étrusque (*Suncus etruscus*) est le plus léger mammifère du monde. La longueur de son corps est comprise entre 3,5 et 5 cm, avec une queue de 2 à 3 cm, pour un poids de 1,8 à 3 g. Elle vit dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord et en Asie du Sud, y compris en Malaisie.

La Musaraigne d'eau ou Crossope aquatique (*Neomys fodiens*) est l'une des plus grandes musaraignes de la péninsule ibérique, où elle vit en Galice, dans les Asturies et dans les Pyrénées. Elle vit principalement en Europe centrale et septentrionale, en Asie Mineure et en Sibérie. Elle vit sur les rives des cours d'eau et des rivières de montagne à faible débit, aux eaux fraîches et oxygénées. On peut aussi la trouver assez loin de l'eau, mais toujours dans des endroits très humides.

Dans sa bouche, elle possède des glandes qui sécrètent une salive neurotoxique, avec laquelle elle empoisonne les petits animaux dont elle se nourrit, comme les grenouilles, les tritons, les araignées, les écrevisses, les petits poissons et les rongeurs. Cependant, ses dents ne sont pas capables de percer la peau des grands mammifères, comme l'homme.

L'Écureuil

L'Écureuil commun ou Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*) est un rongeur arboricole qui vit en Europe et en Asie du Nord. Ce petit écureuil mesure de 38 à 45 cm de long, queue comprise, et est la seule espèce indigène en Europe.

Il vit normalement dans les zones ombragées des forêts de conifères, bien qu'on puisse également le trouver dans les forêts de feuillus. Il s'adapte aux habitats situés entre le niveau de la mer et 2 000 mètres d'altitude, mais on le trouve plus fréquemment dans les zones de basse montagne que dans les zones plus élevées, préférant les forêts nouvelles et fermées.

Au Royaume-Uni et en Irlande, la population de ces écureuils a été considérablement réduite ces dernières années, en partie à cause de l'introduction de l'Écureuil gris (*Sciurus carolinensis*), originaire d'Amérique du Nord.

Les nids de l'Écureuil roux sont sphériques et comportent généralement deux trous d'accès afin de faciliter leur fuite en cas de menace. Ces orifices peuvent également être couverts de l'intérieur. Ils sont généralement construits entre les branches des arbres et leur intérieur est tapissé de mousse, de feuilles, de branches, de paille ou de lichens.

L'Écureuil roux se nourrit principalement de pignons de conifères (en épluchant et en cassant soigneusement les cônes), de noisettes, de faînes, de châtaignes, de champignons, de baies et de jeunes pousses. Plus rarement, il peut aussi manger des œufs ou des oisillons. Il est donc considéré comme un omnivore opportuniste, comme certains autres rongeurs.

Le Grand Pic

Les picidés sont une famille d'oiseaux comprenant 223 espèces, dont la plupart sont communément appelées « pics ». Ils sont présents dans le monde entier, à l'exception de l'Australie, de Madagascar et des régions polaires. Ces oiseaux peuvent être sédentaires ou migrateurs. De nombreuses espèces restent dans la même région pendant des années, tandis que d'autres parcourent de grandes distances entre leur lieu de reproduction et leur lieu d'hivernage. Les plus grandes espèces se trouvent dans le sud de l'Europe.

Les pics se nourrissent d'insectes, de vers et de larves qu'ils trouvent tout au long de l'année, en les capturant sous l'écorce ou en creusant dans les arbres ou les troncs tombés au sol. Les invertébrés tels que les termites et les larves de fourmis et de coléoptères constituent la majeure partie de leur alimentation.

Pour les joueurs d'un certain âge : savez-vous de quelle espèce s'inspire le mythique personnage de dessin animé Woody Woodpecker ? Il s'agit du Pic à tête rouge (*Melanerpes erythrocephalus*), une espèce qui habite les forêts du Canada et du centre des États-Unis.



Le Tamia

Le Tamia rayé ou Tamia strié (*Tamias striatus*) appartient à la même famille que le Tamia de Sibérie, qui comprend également les marmottes, les écureuils volants et les chiens de prairie. Cette espèce, qui vit en Amérique du Nord, est la seule représentante vivante des écureuils du genre *Tamias*. En anglais, on l'appelle *chipmunk*, un nom qui vient du mot *ajidamoonh* en langue ojibwa ou *ajidamoo* dans la variante dialectale des Ottawas, et qui se traduit littéralement par « celui qui descend des arbres la tête la première ».

Le Tamia rayé peut grimper facilement aux arbres, mais il construit des terriers souterrains composés de vastes réseaux de tunnels, souvent à plusieurs entrées. Pour dissimuler l'emplacement de leurs terriers, les tamias les tapissent de feuilles, de pierres, de bâtons ou d'autres matériaux. Le répertoire vocal de ce petit mammifère se compose de cinq sons caractéristiques que l'on peut décrire ainsi : crac, chip-chip, trille, sifflement (ou cri) et claquement.

Le tamia est actif principalement au cours de la journée et passe le plus clair de son temps à chercher de la nourriture. Il préfère les bulbes, les graines, les fruits, les noix, les plantes vertes, les champignons, les insectes, les vers et les œufs d'oiseaux. Il a l'habitude de transporter sa nourriture dans ses abajoues.

La Mésange charbonnière

La Mésange charbonnière (*Parus major*) est le plus grand représentant de la famille des mésanges. Capable de s'adapter facilement à tous les types de milieux, elle vit généralement dans les forêts, surtout de feuillus, mais aussi dans les pinèdes et les milieux boisés non forestiers, comme les oliveraies ou les amandiers, les jardins urbains, etc. Elle niche principalement dans les trous d'arbres, mais peut profiter de n'importe quelle ouverture, depuis les crevasses des arbres, des murs ou des rochers jusqu'aux nichoirs abandonnés, les pots ou même les boîtes de conserve. Son nid est rempli d'une grande quantité de mousse, de poils, de laine et de quelques plumes. Les individus adultes ont tendance à être sédentaires et à défendre un territoire autour de leur lieu de reproduction.

C'est un oiseau insectivore dont le territoire est très vaste. Parmi ses proies, on trouve des chenilles processionnaires, des œufs et des larves de frelons asiatiques, d'autres hyménoptères et quelques coléoptères. En automne, il incorpore à son régime alimentaire des fruits sauvages (tels que des mûres et des baies de sureau), ainsi que des graines riches en huiles. Il s'habitue facilement aux mangeoires d'oiseaux, dont il sélectionne les meilleures graines.

Le Chat sauvage

Le Chat sauvage (*Felis silvestris*) est une espèce sauvage de mammifère carnivore de la famille des félidés qui vit en Eurasie et en Afrique. Il existe cinq sous-espèces de Chat sauvage, dont le Chat sauvage d'Europe (sous-espèce *silvestris*), le Chat sauvage asiatique (sous-espèce *ornata*) et le Chat sauvage d'Afrique (sous-espèce *lybica*). C'est à partir de ce dernier, il y a environ dix mille ans, que les habitants du nord de l'Égypte et du Proche-Orient ont réussi à sélectionner et à domestiquer certains spécimens, donnant ainsi naissance aux Chats domestiques (*Felis silvestris catus*).

Le Chat sauvage d'Europe vit dans les forêts de la péninsule ibérique et de l'Italie, dans le Caucase, dans les forêts d'Europe centrale, dans les Carpates et, dans une moindre mesure, en Écosse, en Irlande, en Islande, en Turquie, en Sicile et en Corse. La destruction de son habitat et les persécutions dont il a fait l'objet ont conduit à une diminution du nombre de spécimens et de sa propagation.

Aujourd'hui, c'est une espèce très rare et protégée dans presque tous les endroits d'Europe où elle vit. Les populations les plus importantes se trouvent dans la péninsule ibérique, en particulier au nord des fleuves Douro et Èbre. D'un naturel nocturne et crépusculaire, il reste un peu plus actif pendant la journée que les Chats domestiques. Les femelles sont sédentaires et territoriales, tandis que les mâles errent et couvrent le territoire de plusieurs femelles. En dehors de la période de reproduction, le Chat sauvage d'Europe est solitaire. Il se nourrit principalement de rongeurs, de lièvres, de lapins et d'oiseaux, et plus rarement d'amphibiens et d'invertébrés. Contrairement au renard, il ne mange pas les os de ses proies.

L'Opossum pygmée

Les Opossums pygmées sont des marsupiaux de la famille des Burramyidae. Celle-ci comprend deux genres : *Burramys* (une seule espèce vivante, l'Opossum nain des montagnes) et *Cercartetus* (quatre espèces vivantes). Ces espèces sont endémiques de l'Australie, de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée.

Ils mesurent de 5 à 12 cm de long et pèsent entre 10 et 50 g. La plupart des Opossums pygmées vivent principalement au sol. Ce sont des animaux nocturnes qui se distinguent par leur capacité inhabituelle à grimper aux branches des arbres, grâce à leur queue et à leurs pattes préhensiles. Pendant la journée, ils dorment dans un nid.

Ce sont des animaux omnivores : ils mangent des graines, des fruits, des feuilles et d'autres aliments végétaux, ainsi que des vers, des insectes, des larves et du nectar. Les Opossums nains des montagnes sont les seuls marsupiaux australiens à hiberner et, avant d'hiberner, ils stockent de la graisse dans leur queue.

On pensait que certaines populations de ces minuscules créatures avaient disparu lors des récents feux de brousse en Australie, mais heureusement, quelques individus ont survécu.

La Mésange de Caroline

La Mésange de Caroline (*Poecile carolinensis*) est une espèce originaire d'Amérique du Nord, où elle vit dans les forêts mixtes ou à feuilles caduques. Ces oiseaux sautillent le long des branches des arbres à la recherche d'insectes, parfois suspendus à l'envers ou en vol stationnaire. Ils peuvent effectuer de courts vols pour attraper des insectes en l'air. Les insectes constituent une grande partie de leur régime alimentaire, notamment en été. Les graines et les baies prennent plus d'importance dans leurs repas en hiver. Ils frappent parfois les graines contre un arbre ou un buisson afin de les ouvrir et peuvent aussi les conserver pour les manger plus tard.

Ces oiseaux nichent généralement dans des cavités, bien qu'ils puissent dormir sur des branches. Différents membres d'une bande peuvent occuper la même cavité au cours de différentes nuits. Alors que les femelles dorment le plus souvent dans la cavité qui sert de nid, les mâles dorment généralement sur une branche voisine.

En hiver, la Mésange de Caroline peut abaisser sa température corporelle et ainsi induire un état intentionnel de torpeur, dans le but de conserver de l'énergie pendant les journées très froides, lorsqu'elle cherche des cavités pour se cacher. Elle peut passer jusqu'à quinze heures d'affilée dans cet état semi-éveillé.

Le Coq

Le coq (*Gallus gallus domesticus*) est le mâle d'une espèce d'oiseau domestique, dont la femelle est appelée « poule ». Selon toute vraisemblance, le Coq doré ou Coq bankiva (*Gallus gallus*) est l'espèce sauvage qui a donné naissance au coq domestique actuel, au cours d'un processus de domestication qui a débuté il y a plus de 10 000 ans au Vietnam. De là, il est passé en Perse, puis dans le royaume de Lydie, en Asie Mineure, avant d'atteindre enfin la Grèce vers le cinquième siècle avant J.-C.

Les coqs sont omnivores : à l'état sauvage, ils grattent constamment le sol à la recherche de graines, d'insectes ou d'animaux plus gros, comme certains reptiles ou de jeunes souris.

La poule se distingue du mâle par sa taille plus petite, sa crête plus courte et l'absence d'éperons au niveau du talon. Ce sont des oiseaux naturellement grégaires, qui ont perdu la capacité de voler en raison de la sélection artificielle opérée par l'homme.

Le coq émet un chant qui ressemble à « Cocorico ». Bien qu'il puisse crier tout au long de la journée, ses cris sont principalement concentrés à l'aube, à midi, en milieu d'après-midi et entre trois et cinq heures du matin. Ces cris constituent un défi territorial contre les autres coqs, un moyen d'attirer les femelles à proximité et un signal d'alarme général.

Si vous vous promenez dans la forêt de Savernake et que vous voyez un coq, qui sait à quelle race indigène du Royaume-Uni il appartient ? Burford Brown, Derbyshire Redcap, Dorking, Indian Game, Ixworth, Marsh Daisy, Modern Game, Modern Langshan, Muffed Old English Game, Norfolk Grey, Old English Game, Old English Pheasant Fowl, Orpington, Rosecomb, Scots Dumpy, Scots Grey, Sebright ou Sussex ? Posez-lui la question et voyez ce qu'il vous répondra !



La Chèvre

La Chèvre domestique (*Capra aegagrus hircus*) est une sous-espèce de chèvre issue de la domestication de la Chèvre sauvage (*Capra hircus*), il y a environ dix mille ans, en Asie du Sud-Ouest et en Europe de l'Est. Ce fut l'une des premières espèces à être domestiquée, afin de tirer profit de son lait, de sa viande, de son suif, de ses poils et de sa peau.

Aujourd'hui, il existe environ 300 races différentes et près d'un milliard d'individus dans le monde. Les chèvres laitières sont principalement élevées dans la région méditerranéenne, en Asie du Sud et dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Afrique. Les principaux producteurs de lait de chèvre sont l'Inde, le Bangladesh et le Soudan.

Les chèvres sont des animaux brouteurs (elles ne paissent pas comme les vaches ou les moutons), c'est-à-dire qu'elles mangent les feuilles, les bourgeons et les pointes des branches d'arbres, en bottes ou lorsqu'elles sont encore jeunes et tendres et peu élevées par rapport au sol. Elles apprécient particulièrement les parties tendres des plantes grimpantes, des ronces, des buissons et des mauvaises herbes. De nature très curieuse, elles mâchent et goûtent presque tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la matière végétale pour déterminer si cela leur fera un bon repas. Les chèvres s'adaptent bien à tous les terrains dont la pente, l'altitude et la variété des plantes disponibles sont au contraire totalement inhabitables pour d'autres espèces de quadrupèdes.

Le Tatou

Les tatous (*Cingulata*) sont de petits mammifères connus pour leur armure osseuse. Des études génétiques récentes ont permis de les classer en deux familles différentes : les Dasypodidae (avec une espèce composée de sept sous-espèces vivantes) et une nouvelle famille, les Chlamyphoridae (composée de dix espèces regroupées en trois sous-familles). Toutes ces espèces vivent dans des habitats variés des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, des jungles et forêts jusqu'aux broussailles et aux zones herbeuses sèches.

Le mot tatou fait référence à son « armure ». Dans les différentes régions où il vit, il est connu sous des noms très différents, tels que mulita, carachupa, jueche, toche, quirquincho (du quechua kirkinchu), āyōtōchtli (qui signifie « tortue-lapin » en nahuatl) ou, donc, tatú (des langues tupi-guarani, qui signifie « carapace dure »).

Son « armure » est constituée de plaques de peau et d'os recouvertes de petites écailles de kératine. La plupart des espèces ont une carapace rigide sur les épaules et les hanches, avec un nombre variable de segments, séparés par de la peau souple, recouvrant leur dos et leurs flancs. D'autres disposent de carapaces recouvrant le sommet de leur tête, la partie supérieure de leurs membres et leur queue. Leur ventre n'est jamais blindé, il est simplement recouvert d'une peau souple et de cuir. Si l'animal ne peut pas fuir les prédateurs ou se cacher dans son terrier, il se protège avec son armure et certaines espèces peuvent même se recroqueviller complètement en une boule blindée. Leur vision n'est pas très bonne et ils utilisent leur odorat pour trouver de la nourriture. Ce sont des animaux nocturnes et d'excellents fouilleurs. De nombreux tatous utilisent leurs griffes acérées pour creuser, ce qui leur permet de construire des terriers et de se nourrir de larves. Ces animaux sont omnivores, mais leur régime alimentaire se compose principalement d'insectes, de larves, de petits invertébrés et de carcasses d'autres animaux. Certaines espèces se nourrissent presque exclusivement de fourmis et de termites.

Les tatous ont des pattes courtes, mais ils peuvent se déplacer assez rapidement et sauter à plus d'un mètre de haut. Ce sont également d'excellents nageurs. Leur température corporelle et leur métabolisme de base sont généralement faibles.

Le Lapin

Les lapins sont un groupe de mammifères de la famille des léporidés, composé de dix espèces différentes. Bien qu'il existe de nombreux individus à l'état sauvage, l'homme a élevé certaines variétés de lapins comme animaux de ferme depuis le Moyen-Âge. L'espèce présente en Europe méditerranéenne est le Lapin commun ou Lapin européen (*Oryctolagus cuniculus*), dont est issu le lapin domestique.

Le Lapin commun ou Lapin européen est un animal grégaire et territorial, qui préfère vivre dans des terriers longs et complexes, habités par six à dix individus adultes des deux sexes.

De nature nocturne et crépusculaire, il se nourrit du crépuscule à l'aube et passe la plus grande partie du reste de sa journée dans son terrier. Son régime alimentaire est exclusivement végétal : herbe, fruits, légumes, feuilles, fruits des bois et, parfois, champignons. Il effectue une double digestion, semblable à celle des ruminants.

Les lapins sont généralement très silencieux, mais ils émettent de petits cris puissants lorsqu'ils sont effrayés ou blessés. Ils communiquent également par l'odeur et le contact physique.



Note aux joueurs de *La Forêt de Savernake*

Si vous avez été attentifs, vous aurez compris que certains animaux apparaissant dans le jeu ne vivent pas, en réalité, dans la forêt éponyme. Pardonnez-nous cette interprétation zoologique quelque peu ludique, mais ces petits animaux nous ont tellement plu que nous n'avons pas pu résister à l'envie de les voir arpenter les sentiers de cette forêt et qu'ils ont tous fini dans la boîte ! Profitez des animaux et, si vous les apercevez dans les bois, laissez-les en paix, à Savernake et dans le monde entier. Ils y sont chez eux.